

Medication List				
Please review this list carefully, and tell us if you are taking or have taken any of these medications. Do NOT discontinue your prescribed medications, including PrEP or PEP, in order to donate plasma				
Medication	Which is also known as...	And is usually used for...	In the last...	You should not donate because the medication may...
Orgaran	danaparoid	Anticoagulants or “blood thinners” (usually to prevent blood clots in the legs and lungs and to prevent strokes)	1 week	Affect the blood’s ability to clot, which might cause excessive bruising or bleeding when you donate
Innohep	tinzaparin			
Fraxiparine	nadroparine			
Xarelto	rivaroxaban			
Fragmin	dalteparin			
Lovenox	enoxaparin			
Pradaxa	dabigatran			
Eliquis	apixaban			
Savaysa	edoxaban			
Coumadin Jantoven Warfilone	warfarin			
Heparin	heparin			
Arixtra	fondaparinux			
Cyclomen	danazol	Androgen	1 week	Harm patients who receive medications prepared from your plasma by causing birth defects or death in unborn babies
Toctino	alitretinoin	severe chronic hand eczema	1 month	
Absorica Accutane Amnesteem Claravis Clarus Myorisan Sotret Zenatane	isotretinoin	Severe acne	1 Month	
Propecia	finasteride	Baldness		
Proscar		Enlarged prostate gland		
Depakote Depakote ER	valproate valproic acid	Epilepsy Bipolar Disorder		

Convulex Eplim Stavzor	sodium valproate	Migraine prevention	1 Month	Harm patients who receive medications prepared from your plasma by causing birth defects or death in unborn babies
Rinvoq CellCept	upadacitinib mycophenolate mofetil	Rheumatoid arthritis Preventing organ rejection		
HepaGam B HyperHEP B S/D Nabi- HB	hepatitis B immune globulin	Exposure to hepatitis B	3 months	Not prevent you from contracting hepatitis B infection following a possible or known exposure
Truvada	emtricitabine/ tenofovir disoproxil fumarate	HIV Prevention- Oral (taken by mouth) (also known as <u>PrEP</u> and/ or <u>PEP</u>)	4 months	Delay detection of HIV infection by tests performed for plasma donations.
Descovy	emtricitabine/ tenofovir alafenamide			
Apretude	cabotegravir	HIV Prevention- Injectable (also known as <u>PrEP</u>)	2 years	
Avodart Jalyn	dutasteride	Enlarged prostate gland	6 months	Harm patients who receive medications prepared from your plasma by causing birth defects or death in unborn babies
Any experimental or unlicensed vaccine or medication			12 months	Harm patients who receive medications prepared from your plasma. Medical evaluation needed.
Arava	leflunomide	Rheumatoid arthritis	2 years	Harm patients who receive medications prepared from your plasma by causing birth defects or death in unborn babies
Aubagio	teriflunomide	Relapsing multiple sclerosis		
Erivedge	vismodegib	Basal cell skin cancer		
Odomzo	sonidegib	Basal cell skin cancer		
Soriatane	acitretin	Severe psoriasis	3 years	
Tegison	etretinate	Severe psoriasis	Ever	
Thalomid	thalidomide	Multiple myeloma		

Revlimid	lenalidomide	Multiple myeloma		
Antiretroviral therapy (ART)		HIV Treatment	Ever	Not prevent you from transmitting HIV infection to patients who receive medications prepared from your plasma.
Growth hormone from human pituitary glands		Delayed growth in children	Ever	Harm patients who receive medications prepared from your plasma by increasing the risk of transmitting CJD or vCJD
Bovine or beef insulin		Diabetes		
Anti-D Immunization Program			Ever	Presence of irregular antibodies to red blood cells
If you are taking or have taken these medications you may not be eligible to donate PLASMA, whole blood or platelets				

Liste de médicaments

Veillez lire cette liste attentivement et préciser si vous prenez présentement l'un de ces médicaments ou si vous en avez déjà pris. N'ARRÊTEZ PAS les médicaments qui vous sont prescrits, y compris la PrEP ou la PEP, pour donner du plasma

Médicament	Aussi connu sous le nom de ...	Est d'ordinaire utilisé pour...	Depuis...	Vous ne devriez pas faire de don puisque ce médicament peut...
Orgaran	danaparoïde	Anticoagulants ou agents qui amincissent le sang (d'ordinaire pour prévenir les caillots sanguins dans les jambes et les poumons et pour éviter les accidents cérébrovasculaires)	La dernière semaine	Affecter la coagulation du sang, ce qui peut entraîner des ecchymoses ou des saignements excessifs au moment de faire un don de sang
Innohep	tinzaparine			
Fraxiparine	nadroparine			
Xarelto	rivaroxaban			
Fragmin	dalteparine			
Lovenox	enoxaparine			
Pradaxa	dabigatran			
Eliquis	apixaban			
Savaysa	edoxaban			
Coumadin Jantoven Warfilone	warfarine			
Heparin	héparine			
Arixtra	fondaparinux			
Cyclomen	Danazol	Androgène	La dernière semaine	Nuire aux patients qui reçoivent des médicaments préparés à partir de votre plasma en provoquant des malformations congénitales ou la mort d'enfants à naître.
Toctino	alitretinoïne	Traitement de l'eczéma chronique grave des mains	Le dernier mois	
Absorica Accutane Amnesteem Claravis Clarus Myorisan Sotret Zenatane	isotretinoïne	Acné grave	Le dernier mois	
Propecia	finasteride	Calvitie		

Proscar		Hypertrophie de la prostate		
Depakote Depakote ER Convulex Eplim Stavzor Rinvoq	valproate acide valproïque valproate de sodium	Épilepsie Trouble bipolaire Prévention de la migraine	Le dernier mois	Nuire aux patients qui reçoivent des médicaments préparés à partir de votre plasma en provoquant des malformations congénitales ou la mort d'enfants à naître.
	upadacitinib	Polyarthrite rhumatoïde		
CellCept	mycophenolate mofetil	Prévenir le rejet d'organe	Les 6 dernières semaines	
HepaGam B HyperHEP B S/D Nabi- HB	immunoglobuline anti-hépatitique B	Exposition à l'hépatite B	Les 3 derniers mois	Ne vous empêche pas de contracter l'hépatite B à la suite d'une exposition possible ou connue.
Truvada	emtricitabine/ tenofovir disoproxil fumarate	Prévention du VIH- par voie orale (PrEP et/ou PEP)	Les 4 derniers mois	Retarder la détection de l'infection par le VIH lorsque des tests sont effectués sur les dons de plasma.
Descovy	emtricitabine/ tenofovir alafenamide			
Apretude	cabotegravir	Prévention du VIH- par voie injectable (PrEP)	Les 2 dernières années	
Avodart Jalyn	dutastéride	Hypertrophie de la prostate	Les 6 derniers mois	Nuire aux patients qui reçoivent des médicaments préparés à partir de votre plasma en provoquant des malformations congénitales ou la mort d'enfants à naître.
Tout vaccin ou médicament expérimental et non homologué			Les 12 derniers mois	Nuire aux patients qui reçoivent des médicaments préparés à partir de votre plasma. Une évaluation médicale s'impose.
Arava	leflunomide	Polyarthrite rhumatoïde	Les 2	

Aubagio	tériflunomide	sclérose en plaques cyclique	dernières années	Nuire aux patients qui reçoivent des médicaments préparés à partir de votre plasma en provoquant des malformations congénitales ou la mort d'enfants à naître.
Erivedge	vismodégib	Cancer de la peau à cellules basales		
Odomzo	Sonidegib	Cancer de la peau à cellules basales		
Soriatane	Acitrétine	Psoriasis grave	Les 3 dernières années	Nuire aux patients qui reçoivent des médicaments préparés à partir de votre plasma en provoquant des malformations congénitales ou la mort d'enfants à naître.
Tegison	Etretinate	Psoriasis grave	À n'importe quel moment	
Thalomid	thalidomide	Myélome multiple		
Revlimid	lenalidomide	Myélome multiple		
Thérapie antirétrovirale (TAR)		Traitement contre le VIH	Déjà	Ne vous empêche pas de transmettre l'infection par le VIH aux patients qui reçoivent des médicaments préparés à partir de votre plasma.
Hormone de croissance provenant des glandes pituitaires humaines		Retard de croissance chez les enfants	À n'importe quel moment	Nuire aux patients qui reçoivent des médicaments préparés à partir de votre plasma en augmentant le risque de transmission de la maladie de CJ ou de la vMCJ
Insuline bovine ou de bœuf		Diabète		
Programme de vaccination anti-D			à tout moment	Présence d'anticorps irréguliers dirigés contre les globules rouges
Si vous prenez ou avez déjà pris l'un de ces médicaments, il est possible que vous ne soyez pas admissible à donner du PLASMA, du sang total ou des plaquettes				

THIS IS THE END OF THIS FORM