

Medication List - Short Version

SOME MEDICATIONS MAY AFFECT YOUR ELIGIBILITY TO DONATE PLASMA. PLEASE TELL US IF YOU...						
Are being treated with the following types of medications....	or have taken...	which is also called...	anytime in the last....	You should not donate because the medication may...		
Anticoagulants or “blood thinners” (usually to prevent blood clots in the legs and lungs and to prevent strokes)	Orgaran	danaparoid	1 Week	Affect the blood’s ability to clot, which might cause excessive bruising or bleeding when you donate		
	Innohep	tinzaparin				
	Fraxiparine	nadroparine				
	Xarelto	rivaroxaban				
	Fragmin	dalteparin				
	Lovenox	enoxaparin				
	Pradaxa	dabigatran				
	Eliquis	apixaban				
	Savaysa	edoxaban				
	Coumadin Jantoven Warfilone	warfarin				
	Heparin	heparin				
	Arixtra	fondaparinux				
Acne treatment	Absorica Accutane Amnesteem Claravis Myorisan Sotret Zenatane	isotretinoin	1 Month	Harm patients by causing birth defects in unborn babies		
	Hair loss remedy	Propecia			finasteride	1 Month
	Prostate symptoms	Proscar			finasteride	1 Month
		Avodart Jalyn			dutasteride	6 Months
	Psoriasis	Soriatane			acitretin	Ever
		Tegison			etretinate	
Basal cell skin cancer	Erivedge	vismodegib	24 Months	Harm patients by causing birth defects or the death of an unborn baby		
Relapsing multiple sclerosis	Aubagio	teriflunomide	2 Years			
Hepatitis exposure	Hepatitis B Immune Globulin	HBIG	1 Year	Not prevent you from contracting hepatitis B infection		
Experimental Medication or Unlicensed (Experimental) Vaccine			Ever	Harm patients since medical evaluation is needed.		
Growth hormone from human pituitary glands			Ever	Harm patients by increasing the risk of transmitting CJD or vCJD		
Bovine or Beef Insulin			Ever			
Please note: Donors SHOULD NOT discontinue medications prescribed or recommended by their physician in order to donate plasma.						

Liste de Médicaments – Version Courte

CERTAINS MÉDICAMENTS PEUVENT VOUS RENDRE INÉLIGIBLE AU DON DE PLASMA. VEUILLEZ NOUS AVISER SI...				
vous prenez les types de médicaments suivants :	ou si vous avez pris un des médicaments suivants :	qui s'appelle également :	à tout moment durant :	Vous ne devriez pas faire de don de plasma parce que le médicament peut...
Des anticoagulants (habituellement pour prévenir les caillots de sang dans les jambes et les poumons et pour prévenir les accidents vasculaires cérébraux)	Orgaran	danaparoïde	la dernière semaine	nuire à la capacité de coagulation du sang, ce qui peut provoquer des hémorragies ou des saignements excessifs au moment du don.
	Innohep	tinzaparine		
	Fraxiparine	nadroparine		
	Xarelto	rivaroxaban		
	Fragmin	daltéparine		
	Lovenox	enoxaparine		
	Pradaxa	dabigatran		
	Eliquis	apixaban		
	Savaysa	édoxaban		
	Coumadin Jantoven Warfilone	warfarine		
	Heparin	héparine		
Arixtra	fondaparinux			
Un médicament pour l'acné	Absorica Accutane Amnesteem Claravis Myorisan Sotret Zenatane	isotrétinoïne	le dernier mois	nuire à la santé des receveurs en provoquant des malformations congénitales.
Un médicament pour la perte de cheveux	Propecia	finastéride	le dernier mois	
Un médicament pour les troubles de la prostate	Proscar	finastéride	le dernier mois	
	Avodart Jalyn	dutastéride	les six derniers mois	
Un médicament pour le psoriasis	Soriatane	acitrétine	à tout moment	nuire à la santé des receveurs en provoquant des malformations congénitales ou le décès d'un bébé à naître.
	Tegison	étrétinate		
Un médicament pour le carcinome basocellulaire	Erivedge	vismodegib	Les 24 derniers mois	
Un médicament pour la sclérose en plaques cyclique	Aubagio	térfunomide	les deux dernières années	
Un médicament pour l'exposition à l'hépatite	Immunoglobuline anti-hépatite B	IgHB	la dernière année	ne pas vous empêcher de contracter l'hépatite B.
Un médicament expérimental ou un vaccin non autorisé (expérimental)			à tout moment	nuire à la santé des receveurs en causant du tort étant donné qu'une évaluation médicale est nécessaire.
Une hormone de croissance extraite de l'hypophyse humaine			à tout moment	nuire à la santé des receveurs en augmentant le risque de transmission de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (MCJ) et de sa variante (vMCJ).
De l'insuline bovine			à tout moment	

Nota : Les donneurs **NE DEVRAIENT PAS cesser de prendre un médicament** prescrit ou recommandé par leur médecin dans le but de donner du plasma.